

נקודה דזק ד"ר ענת יפה וד"ר אורית טיזט

סלהם וטומכהות



הפסיקת עישון וההפחתת צריכת אלכוהול.
במקרים מודרניים יותר, ניתן לרשום תרופות המגבירות זקפה הניגנות לפני מרשם רופא.

שלוש התרופות הקימות ביום פועלות במנגנון דומה של העלתת ניסטריק אוקסיד (ONO), שיכות לבוצצת מעכבי 5-PDE (ויאנברה, לווטרה, סיאלייס). לשוטן יעלות ומסיועת בהשגת זקפה בחולי סוכרת בעקבות גירוי מיני.

כאשר הטיפול התרופתי הזה אינו פוטר את הבעיה, מפניים לעיווץ אורולוגי, כדי לבדוק אפשרות לקבלת טיפול אחד כגון: חורקת תרופות לפני, מכך שיראו ואקום המכסייעים להיווצרות זקפה או השתלה כירורגית של תותב לפין.

הטיפול באישה

טיפול באמצעות משחות מקומיות להגברת לחות הנרתיק.

טיפול ניחומיים מקומיים ובתכشيرיים להגברת חشك מיני.

כמו אצל הגבר, גם אצל האישה, איזון של הסוכרת וטיפול מניעתי, מסיע ניכרות.

מתן הורטוני מין גברים, כגון סטטוסטרון לנשים, בעיקר בנשים לאחר הפסקת הווסת, נמצא כמשמעותי מרכיבים רבים בתפקיד המיני.

הדגש העיקרי במציאות פתרון לביעית תפקיד מיני בקרב חוליות סוכרת, נשים וגברים, בטמן בהרטת מוחסם הבושה אצל התולמים בכוון לרופא המטפל. חשוב שגם הרופא המטפל יתחקור היטב את המטופל בכל מפגש ויעלה את הנושא בפניו.

ד"ד ענת יפה, מנהלת המכון לאנדוקרינולוגיה ודיז אודית מיטט, מומחית ברפואה פנימית ורופאה במכתן האנדוקרינולוגי, המרכז הרפואי הלל יפה

• פגיעה בכלי דם – זקפה מתרחשת למשהו כאשר חללי הפין מתמלאים בדם. טרשת העורקים המטאצט בחולי סוכרת עלולה לגרום גם בכלי הדם המספקים את עורקי הפין והאגן.

• גודמים נוספיםים כגון עישון יותר לחץ דם, מחלות לב כליליות המופיעות בשכיחות גבוהה בחולי סוכרת ועוד. גברים חוליות סוכרת נוטים להיות בעלי כמות נמוכה יותר של סטטוסטרון (הורטון המין הגברי), עניין שעלול להיות גורם מפריע בזקפה.

• תרופות שונות – אותן גוטלים פעמים רבות חוליות הסוכרת כגון חלק מתרופות להורדת לחץ הדם, ותרופות נוגדות כאב ודיכאון שונים, עלולות לגרום לפגיעה ביכולת הזקפה. התרופות הקימות לטיפול בסוכרת אינן פונקטיות בתפקיד המיני.

לא לגברים בלבד

בעיות בתפקיד המיני קימות גם בקרב הנשים החולות בסוכרת. במחקר שבוצע בשנת 2005 נמצא כי-71 אחוז מהנשים הנשואות החולות בסוכרת מסוג 1 ו-42 אחוז מהחולות בסוכרת סוג 2 סובלות מ-

פרעה בתפקיד המיני, בהשוואה ל-37 אחוז נשים בקבוצת הביקורת. הפגיעה אצל נשים מתבטאת בעיקר בפגיעה בעוררות המינית, בסיכה (זובע בגרתית) וביכולת להגיע לאורוגמה. בניגוד לגברים, הגורמים לפגיעה בתפקיד המיני אצל נשים אינם ברורים דיים. אחד הגורמים השכיחים לכאבים ואי-נוחות בזמן יהסם מן הוא דלקות בגרתיק הנגרמות על ידי פטריות הקנדידה. דלקות אלו שכיחות מאד בחולות סוכרת, בעיקר במקרה ערכי הסוכר נבותים.

הטיפול בגבר

• פגיעה במערכת העצבים – על מנת שהగירוי המיני הנקלט באחד החווישים יתבטא בזקפה יש צורך בהעברה של שדר עצבי אל איוור אברי המין. בחולי סוכרת קיימת פגיעה עצבית וחלקל ממנה גם פגיעה בהעברת המסר הזה.

הסות מחסום הבושה, חזוזות וטיפול,
יפתורן גם את הקושי בתפקיד המיני
אצל חוליות סוכרת, נשים וגברים כאחד

חקרים מדוחים כי בין 50 ל-75 אחוז מכל הגברים החולות בסוכרת חוותו פגיעה ביכולת הזקפה בדרגות שונות, למורת קיומו של חشك מיני תקין. הפגיעה בזקפה יכולה להיות קלה, אך ללא תתייחסות וולמת היא עלולה להתפתח בחודגה עד לחומר יכולת לקיים יחס פשוט.