


# شرح مبسّط تنظير الأمعاء الغليظة (القولون)

معهد أمراض الجهاز الهضمي  
المركز الطبي هلل يافة - الخضيرة




## ما هو تنظير الأمعاء الغليظة؟

- هو إجراء طبي يقوم به طبيب لفحص الأمعاء الغليظة.
- يُدخل الطبيب أنبوباً دقيقاً عن طريق فتحة الشرج (المنظار) مزوداً في طرفه بكاميرا وإضاءة، حيث يتيح النظر مباشرة إلى الأمعاء لتشخيص الأمراض وللمعالجة.
- يتم إجراء هذا الفحص فقط بعد إذن المريض وموافقته المسبقة.




## كيف يتم الفحص:

- قبل البدء بالفحص يتم اعطاء المريض حقنة للتخدير عن طريق الوريد.



- يستلقي المريض على جانبه الأيسر.


- بعد تخدير المريض يتم ادخال المنظار عن طريق فتحة الشرج.




## أثناء الفحص:

- يستغرق الفحص عادة 15-30 دقيقة لإتمامه، وأحياناً قد يستغرق أكثر من ذلك.
- خلال الفحص تتم مراقبة المريض، التنفس ودقات القلب.
- وفق الحاجة يتم إدخال أدوات عمل طبية عن طريق الأنبوب للمساعدة في العلاج أو التشخيص.
- بعد الاستفاقة والتعافي من الفحص- يحصل المريض على تقرير طبي يفصل النتائج.

## استعمالات المنظار الطبية:



- أخذ عينات/ خزعات
- استئصال الأورام الحميدة
- معالجة أنواع النزيف بواسطة الكي
- استخراج الاجسام الخارجية العالقة
- توسيع الانسدادات والمناطق الضيقة
- ادخال داعم معدني
- وأشياء عديدة أخرى




## مضاعف ومخاطر:

المضاعفات نادرة عادة، ولكن ممكن أن تحدث  
ويجب معرفتها قبل الموافقة على الفحص:

- الام وانتفاخ في البطن
- نزيف حاد أو تمزق في الجهاز الهضمي  
والذي قد يستدعي عملية جراحية طارئة
- حساسية لأدوية التخدير

## كيفية الاستعداد للفحص؟



- يجب تنظيف الأمعاء جيدا عن طريق استعمال وصفات طبية تساعد على تسهيل الاخراج- يجب تناول هذه الوصفات حسب التعليمات المرفقة لها
- يجب الامتناع كليا عن تناول الطعام 4 ساعات قبل الفحص على الأقل.
- يجب القدوم الى المعهد مع شخص مرافق، ليصحبك بعد الانتهاء من الفحص
- تُمنع القيادة لمدة 12 ساعة بعد اجراء الفحص.

# بالنجاح



## استعدادات أخرى للفحص...

- ضرورة التواصل مع الطبيب المعالج لكل مريض يتناول أدوية لتمييع الدم للتنسيق حول المدة الزمنية التي يجب فيها عدم تناول الدواء قبل الفحص.
- كل مريض يمتلك جهاز تنظيم دقات القلب يجب التنسيق مسبقاً مع المعهد ومع طبيب القلب المعالج.
- المرضى دون سن ال 18 عاماً، أو الذين ليس بإمكانهم قانونياً التوقيع على موافقة مسبقة- يجب حضور الأهل أو وصي/وكيل المريض للتوقيع مكانه.