

# የ"ካፕሱል" የቪዲዮ መከራ ማብራሪያ

የሰብሳቢነት ጥቃቶች ተቋም  
ሂሴል ያሬ የሕክምና ማእከል

# የ"ካፕሱል" ምርመራ ምንድነው?



- “ካፕሱል” የክረን መጠን ያለው ካሜራ ነው.
- “ካፕሱል” የምግብ መፍጫውን ስርዓት ይፈትሽታል, በተለይም ለትናንሽ አንጀት ይለካል.

ካፕሱል" የጨዳራን ወደ ውስጣዊ እይታ ለመመልከት እና ስዕሎችዎን ወደ ሰውነት ወለድ የመቅዳት መሳሪያ ይልኩዎታል.

# በ"ካፕሱላ" ውስጥ ሊታወቁ የሚችሉ ግኝቶች



- በጣም የተለመደው የ "ካፕሱላ" ምክንያት በትናንሽ አንጀት ውስጥ የደም መፍሰስ ምንጭ ፍለጋ ነው.
- ይህ ምርመራ ፖሊፒዎችን, የሆድ በሽታ መከላከያን (የጎብ በሽታ), የሆድ እኩኩ (tumors), እብጠባዎች ወይም ሌሎች የትናንሽ የአንጀቶችን ነጠብሳትን ለመለየት ጠቃሚ ሊሆን ይችላል.

# የ"ካፕሱላ" ምርመራ ሂደት:



- ይህም የውጭ "አካል" አካል ወደ አካል ውስጥ መጀመርን የሚያካትት ሲሆን ስለዚህ ምርመራው በመረጃ ስምምነት በመፈረም ይጠይቃል.
- ምርመራው "ካፕሱላው" በማዋጥ ይጀምራል.
- ከዚያም ከሆድዎ ጋር የተያያዘውን መሳሪያ በቀበቶ ይያዛል. በዚህ ደረጃ ላይ በቤትዎ ይለቀቃሉ.


# የ”ካፕሱላ” ምርመራ ሂደት:



- ይህ ንጥረ ነገር ከዋጡ በኋላ የጀርባ “ካፕሱላው” ይቆጣራል ይነሳና ምስሎችን ወደ ቀረፃው መሣሪያ ይልካል.
- “ካፕሱላው” ከዋጡ በኋላ - ያልተለመዱ ስሜቶች ሊኖሩ አይገቡም.
- የተካፈሉ ሐኪሞች ምስሎቹን ይመለከታሉ እና በመጨረሻው ደረጃውን ይፋ ያደርጋሉ.

# ከሙከራው ጋር የተዛመዱ ስጋቶች

"የካፕሱላ" ውስብስቦች እምብዛም ባይሆኑም, የውጭ ንጥረ ነገሮች ለሰውነታቸውን በመዋጥ ምክንያት ሊያስከትሉ የሚችሉ .



- “ካፕሱላ” የደም ሥር መውደድን የሚያመጣው የጨጓራ ክፍል (gastrointestinal stenosis) በሚገኝበት አካባቢ ሊቆም ይችላል. የአንጀት መሰንጠቅን ሊያመጣ ይችላል.
- የኩላሊት መዘጋት ምልክቶች ሊታዩባቸው የሚችሉ: ያልተለመደ የሆድ እብጠት, የሆድ ህመም, የማቅለሽለሽ እና / ወይም ማስታወክ ናቸው.
- በማንኛውም ትኩሳት, የመተንፈስ ችግር, ወይም የደረት ሕመም, ዶክተርዎን ወዲያውኑ ያጋሩ.

# ለምርመራው እንዴት መዘጋጀት ይቻላል?

- ከ 18 ዓመት በታች የሆነ ታካሚ ወይም ለታወቀ ሕመምተኛ ያልታወቀ ፈቃድ ወላጅ / አሳዳጊ መሆን አለበት.
- ባዶ ሆድ የተሻለና ደህንነቱ የተጠበቀ ሙከራን ይፈቅዳል. ስለዚህ, ከመፈተሽ በፊት ለ 12 ሰዓታት ከመብላትና ከመጠጥ ይቆጠቡ. በተጨማሪም ስጋ, ፍራፍሬዎች እና አትክሌቶች ከጾተናው በፋት ሆ 24 ሰዓታት ለቀሩ ይገባሉ.



# ምርመራው/ሙከራው ከጀመረ በኋላ፡



- “ካፕሱላው” ከመውሰድ ሁለት ሰዓት በኋላ ውሃ መጠጣት ትችላላችሁ.
- ከአራት ሰዓት በኋላ ቀላል ምግብ መመገብ ይችላሉ.
- “ካፕሱላው” ከወሰዱ በኋላ ለ 10 ሰዓታት ያህል መሳሪያው እና ቀበቶው ሊወገድ ይችላል.
- “ካፕሱላው” ከተወሰኑ ሰዓታት ወይም ቀናት ከሰውነት እንዲወጣ ይጠበቃል. ወደ ሰውነት ውስጥ መምለስ አያስፈልግም.
- ከሰሙን ብኝላ ካልወጣ ወደ እኛ ይቅረቡ.
- የምርመራው ውጤት ከ2 ሰሙን በኋላ ይሰጣል.

የስትሮቴሮሜንቶሎጂ ተቋም ሠራተኞች ጥሩ ጤንነት እና መልካም እድል ይመኛል!