



הסבר על בדיקת וידאו קפסולה

המכון לגסטרואנטרולוגיה
המרכז הרפואי הלל יפה

מהי בדיקת קפסולה?

- הקפסולה היא מצלמה בגודל כדור-תרופה.
- הקפסולה בודקת את מערכת העיכול, ובעיקר מיועדת לבדיקת המעי הדק.
- הקפסולה מאפשרת הסתכלות בתוך חלל המעי ושולחת את התמונות למכשיר הקלטה הנישא על הגוף.



ממצאים שניתן לאבחן בקפסולה:

- הסיבה השכיחה ביותר לביצוע קפסולה הינה חיפוש אחר מקור דימום במעי הדק.
- הבדיקה יכולה להיות שימושית לגילוי פוליפים, מחלות מעי דלקתיות (קרוהן), כיבים, גידולים או נגעים אחרים של המעי הדק.



מהלך בדיקת קפסולה:

- מדובר בפעולה של החדרת "גוף זר" לתוך הגוף ולכן הבדיקה מצריכה חתימה על הסכמה מדעת.
- הבדיקה מתחילה בבליעת הקפסולה.
- בהמשך תחובר/י למכשיר הצמוד לבטן ומקובע בעזרת חגורה. את/ה יכול/ה בשלב זה להשתחרר לביתך.




מהלך בדיקת קפסולה:

- לאחר בליעתה, הקפסולה מצלמת בדרכה את דופן המעי ושולחת את התמונות למכשיר ההקלטה.
- לאחר בליעתה של הקפסולה - לא אמורה להיות כל תחושה יוצאת דופן.
- הרופא המטפל יצפה בתמונות ויפענח את הבדיקה בשלב מאוחר יותר.



סיבוכים הקשורים בבדיקה:



סיבוכי קפסולה הם נדירים, ובכל זאת יתכנו,

כתוצאה מבליעת הגוף הזר:

- הקפסולה יכולה להיעצר באזור שיש בו היצרות במערכת העיכול, דבר שעלול לגרום לחסימת מעי.
- סימנים אפשריים לחסימת המעי כוללים:
תפיחות בטנית לא שגרתית, כאב בטן, בחילות ו/או הקאות.
- בכל מצב של חום, קושי בבליעה או הופעת כאבים בחזה, שתף את הרופא שלך מיידית.

כיצד להיערך לבדיקה?

- מטופלת מתחת לגיל 18 או מטופל שאינו בר-חתימה על הסכמה מדעת - חייב מעורבות הורה/אפוטרופוס.

- קיבה ריקה מאפשרת ביצוע הבדיקה באופן מיטבי ובטוח. לכן יש להימנע מאכילה ושתייה למשך כ - 12 שעות לפני הבדיקה. כמו כן, יש להימנע מצריכת בשר, פירות וירקות יממה טרם הבדיקה.



אחרי תחילת הבדיקה:

- כעבור שעתיים מבליעת הקפסולה ניתן לשתות מים.
- כעבור ארבע שעות ניתן לאכול ארוחה קלה.
- כעבור 10 שעות מעת בליעת הקפסולה ניתן להוריד את המכשיר והחגורה.
- הקפסולה צפויה לצאת מהגוף לאסלה כעבור מספר שעות עד ימים. אין צורך להחזירה.
- במידה ששמת לב שכעבור שבוע הקפסולה לא יצאה בהפרשות – דווח/י לנו.
- תשובה לבדיקה תישלח אליך הביתה תוך כשבועיים מהבדיקה.



צוות מכון הגסטרואנטרולוגיה מאחל לך
בריאות שלמה ובהצלחה!